

# Primena subkutanih inekcija

Priručnik za roditelje



# PRIMENA LEKA POTKOŽNOM INJEKCIJOM

Cilj ovog uputstva je da Vam pomogne da sami svom detetu date lek potkožnom injekcijom.

Samostalno davanje leka, u kućnim uslovima, poštedeće Vaše dete stresnog dolaska u bolnicu, smanjiće mogućnost nastanka infekcije izbegavanjem kontakta sa drugom decom i konačno uštedeće Vam vreme i trošak.

Ovo uputstvo će uvek biti praćeno obukom, tokom koje će Vam medicinsko osoblje detaljno objasniti postupke davanja potkožne injekcije i omogućiti da prvi put injekciju date Vašem detetu u prisustvu medicinskog osoblja u bolničkim uslovima. Takođe, biće Vam obezbeđen lek, kao i sav potreban materijal za davanje injekcije.

1. Lek je potrebno izvaditi iz frižidera 10-15 minuta pre davanja da bi se ugrijao do sobne temperature
2. Smestite u udoban položaj Vaše dete (sedeći položaj je odgovarajući, ali može i ležeći ukoliko je Vama i Vašem detetu tako prijatnije), na dobro osvetljenom mestu, po mogućstvu pored stola ili neke druge čiste radne površine na koju ćete staviti lek i potreban materijal
3. Pripremiti potreban materijal i staviti na čistu radnu površinu blizu deteta: špric sa lekom, tupfere, medicinski alkohol, rukavice
4. Operite ruke vodom i sapunom i stavite rukavice
5. Odaberite mesto uboda i očistite ga kružnim pokretom tupferom natopljenim alkoholom



6. Uzmite špric sa lekom u jednu ruku, a drugom rukom napravite kožni nabor na mestu gde ćete dati injekciju, vodeći računa da planirano mesto uboda ne dodirujete prstima
7. Pod uglom od 45 stepeni, ubodite iglu u kožni nabor tako da igla u potpunosti uđe pod kožu



8. Pustite kožni nabor i istom rukom fiksirajte plastični deo igle da se igla ne pomera i onda laganim pritiskanjem klipa šprica do kraja ubrizgajte lek



9. Kada ste ubrizgali svu količinu leka, izvadite iglu i špric iz kože, a mesto uboda očistite tupferom natopljenim alkoholom
10. Špric i iglu odložite na bezbedno mesto, da bi izbegli mogućnost povređivanja

NURDOR